R2|Agro

Fosibol®

Calcium– und Phosphor-Bolus zur Vorbeugung von Phosphormangel und Milchfieber



Tiergruppe
Milchvieh

Verbrauch
2 - 3 Boli pro Kuh

Packungsgröße
4 Boli à 150 g im Reißverschlussbeutel
16, 24 oder 48 Boli pro Packung

WAS ist FosiBol
FosiBol ist ein neu entwickelter Mineralergänzungsfutter-Bolus, der Phosphor und Calcium enthält, das sich im Pansen schnell auflöst.
FosiBol enthält eine Kombination aus Phosphor, Calcium und Magnesium, die Milchfieber und Phosphormangel effektiv vorbeugt.

FosiBol enthält leicht aufnehmbares Phosphor und Calcium, das den Phosphor- und Calciumspiegel im Blut nach der Einnahme schnell erhöht.

Magnesium wirkt Muskelkrämpfen und Nervenstörungen entgegen.

WANN
Unmittelbar vor und nach dem Abkalben zur Vorbeugung von Phosphormangel und Milchfieber bei Kühen.

WIE
Drittkalbkühe und ältere Kühe:
In der Abkalbphase werden 2 - 3 Boli im Abstand von 10 - 14 Stunden verabreicht.

Nachbehandlung:
Im Anschluss an die tierärztliche Behandlung (Calcium-Infusion):
1. Bolus: 2 Stunden nach der Calcium-Infusion
2. Bolus: 12 Stunden nach der Calcium-Infusion

PRAKTISCHE VORTEILE & WIRKUNG
- Schnelle und einfache Verabreichung
- Schnelle Auflösung im Pansen
- Versorgung mit Phosphor und Calcium
- Kein unangenehmer Geschmack
- Kein Verschluckrisiko

R2 Agro
Mimersvej 1
DK-8722 Hedensted
Tel.: +45 76741200
www.r2agro.com
USt.-IdNr: DK13633398
Zulassungsnummer:
α-208-G756042

PRODUKTDATENBLATT/REVIDIERT: 01-10-2015

FosiBol

Artikel-Nr.	17002113
Anwendung:	Schnell- und leichtlöslicher Phosphor und Calcium Bolus für Milchkühe zur Verminderung des Milchfieber-Risikos und Vorbeuge von Phosphormangel
Physische Erscheinung:	Bolus
Diameter:	34 mm
Länge:	165 mm
Gewicht:	Min. 150 Gramm
Zusammensetzung:	Monocalciumphosphat Magnesiumsulfat, Heptahydrat Cellulosefasern Pflanzenfett

Analytische Bestandteile:

Calcium	14,80%
Phosphor	20,70%
Magnesium	1,25%
Calcum, je Bolus	23 Gramm
Phosphor, je Bolus	32 Gramm

Unerwünschten Stoffe: Entspricht der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung mit ihren Änderungen und Ergänzungen.

Fütterungshinweise:

1. Bolusgabe: unmittelbar nach dem Abkalben
2. Bolusgabe: 10-14 Stunden nach dem Abkalben

Simultan kann ein CaliBol Calzium-Bolus verabreicht werden, um Milchfieber zu verhindern.

Nachbehandlung:
1 Bolus in Kombination mit einer intravenösen Calzium-Infusion

Packungsgröße:	4 Boli im geschlossenen Plastikbeutel. 16 Boli je Packung
Lagerung:	Trocken , bis zur Verabreichung im verschlossenen Plastikbeutel lagern.
Haltbarkeit	2 Jahre nach Herstelldatum
Hersteller:	R2 Agro A/S Registrierungsnummer: α-208-G756042